

病害虫情報(第8号)11月予報

令和8年10月30日
神奈川県農業技術センター

病害虫防除部 TEL 0463-58-0333
ホームページ <https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450002/>

【内容】

- I 11月の主な病害虫の発生予報、防除要否、使用する薬剤例 1
【水稻、カンキツ、抑制トマト、促成トマト、抑制キュウリ、促成イチゴ、ネギ、キャベツ、ダイコン】
II 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠 9

- 農薬使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、遵守すべき基準を守り、飛散防止に努めましょう。
○ 掲載農薬は一般的な場合を想定し、防除効果を優先して選定しています。
○ [神奈川県総合防除計画を参考にし、化学農薬のみに依存しない防除に努めましょう。](#)
※ 農薬に関する情報は、令和8年10月28日までの農薬登録情報に基づいて記載しています。

I 11月の主な病害虫の発生予報、防除要否、使用する薬剤例

【水 稻】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
イネ縞葉枯病	—	—	❖ 9月調査では、イネ縞葉枯病の発生は平年よりやや少ない。媒介虫のヒメトビウンカの越冬場所を減らすため次の対策を実施する。 ①「ひこばえ」や水田内雑草をすき込む。 ②畦畔や休耕田の除草を徹底する。
スクミリンゴガイ	—	△	❖ スクミリンゴガイの生存率を下げる目的で次の対策を実施する。 ①秋期に水田を複数回耕起すると殺貝効果が高い。耕うんは走行速度を遅くし、ロータリーの回転を速くして浅く細かく耕す。 ②休耕田も発生源になるので、できるだけ①の対策を実施する。 ③未発生水田への貝の持ち込みを防止するため、トラクターなどに付着した泥は使用後に洗浄する。他水田でも使用する場合は、未発生水田の耕起を先に行うなど順番を考慮する。 ❖ 詳細は、以下の防除対策資料を参照すること。 神奈川県スクミリンゴガイ防除対策マニュアル（農業技術センター）

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) 神奈川県農業技術センター

【カンキツ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
貯蔵病害 青かび病 緑かび病 軸腐病	並	○	(予・治) ベルクートフロアブル みかん:[前日,3回] 青かび病、緑かび病:1,000～2,000倍、軸腐病:1000倍 みかんを除くかんきつ:[前日,2回] 青かび病、緑かび病:1,000～2,000倍、軸腐病:1000倍 (予・治) ベンレート水和剤 みかん:[前日,4回] 4,000～6,000倍 みかんを除くかんきつ:[前日,2回] 4,000～6,000倍 等 ❖ 収穫時に傷を付けないようにし、傷果は貯蔵庫に持ち込まない。
ハダニ類 ミカンハダニ	並	○	オマイト水和剤 みかん:[7日,2回] 750倍 みかんを除くかんきつ:[14日,2回] 750倍 等 ❖ 収穫果を長期貯蔵する場合は防除する。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) …… 神奈川県農業技術センター

【抑制トマト】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例										
			❖防除のポイント										
葉かび病	—	○	(予) インプレッションクリア [発病前～発病初期, —] うどんこ病:1,000～2,000倍、葉かび病:1,000倍										
うどんこ病	—	○	(予) ボタニガードES [発病前～発生初期, —] うどんこ病:1,000倍 (予・治) ポリオキシシンAL水和剤 [前日,3回] 葉かび病:1,000倍 (予・治) ベルクートフロアブル [前日,3回] 2,000～4,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日, —] うどんこ病:300～600倍 (治) ベミデタッチ [前日, —] うどんこ病:500倍										
			等 ❖ 葉かび病の抵抗性品種を使用している場合でも、その抵抗性を無効化させないために、ほ場内の菌密度上昇を防ぐ薬剤防除は必要である。										
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや多	○	モスピラン顆粒水溶剤 [前日,3回] 2,000倍 ベネビアOD [前日,3回] 2,000倍 ファインセーブフロアブル [前日,3回]										
アザミウマ類	—	○	タバココナジラミ類、アザミウマ類:1,000～2,000倍 ボタニガードES [発生初期, —] コナジラミ類:1,000～2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日, —] コナジラミ類:300倍 ベミデタッチ [前日, —] コナジラミ類:500倍 等 ☞ ベミデタッチは成虫飛来前や発生初期に使用し、7日間隔で複数回散布する。										
			❖ ウイルス病の感染を防ぐためにも害虫の防除を徹底する。 <table><tr><th>発生するウイルス病</th><th>媒介する害虫</th></tr><tr><td>CMV等(トマトモザイク病)</td><td>アブラムシ類</td></tr><tr><td>TYLCV(トマト黄化葉巻病)</td><td rowspan="2">コナジラミ類</td></tr><tr><td>ToCV(トマト黄化病)</td></tr><tr><td>TSWV(トマト黄化えそ病)</td><td rowspan="2">アザミウマ類</td></tr><tr><td>CSNV(トマト茎えそ病)</td></tr></table>	発生するウイルス病	媒介する害虫	CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類	TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類	ToCV(トマト黄化病)	TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類	CSNV(トマト茎えそ病)
発生するウイルス病	媒介する害虫												
CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類												
TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類												
ToCV(トマト黄化病)													
TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類												
CSNV(トマト茎えそ病)													
			❖ ウイルス病発病株は抜き取り、土中に埋めるなど適切に処分する。 ❖ 施設内外の雑草は、害虫の発生・増殖源になるため、除草を徹底する。 ❖ 施設開口部に0.4mm目合い以下の防虫ネットを2重被覆する。										

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) …… 神奈川県農業技術センター

【促成トマト】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント										
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや多	○	【育苗期:粒剤施用】 アルバリン 又は スタークル粒剤 [育苗期,1回:株元散布] コナジラミ類:1～2g/株 【育苗期:散布】 ベストガード水溶剤 [前日,3回] 1,000～2,000倍 スピノエース顆粒水和剤 [前日,2回] アザミウマ類:5,000倍 マッチ乳剤 [前日,4回] コナジラミ類:2,000倍 アザミウマ類:1,000～2,000倍 ボタニガードES [発生初期,－] コナジラミ類:1,000～2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,－] アブラムシ類、コナジラミ類:300倍 ベミデタッチ [前日,－] コナジラミ類:500倍 ☞ ベミデタッチは成虫飛来前や発生初期に使用し、7日間隔で複数回散布する。 【育苗期後半～定植時:粒剤施用または灌注】 プリロソソ粒剤オメガ [育苗期後半～定植時,1回:株元散布] 2g/株 又は、ベリマークSC [育苗期後半～定植当日,1回:灌注] 原液25mlを10～20Lに希釈/400株 ☞ 上記2剤は成分が同じであるため、どちらかを使用する。 【定植時:粒剤施用】 モスピラン粒剤 [定植時,1回:植穴土壌混和] コナジラミ類、アブラムシ類:1g/株 ダントツ粒剤 [定植時,1回:植穴処理土壌混和] 1～2g/株 等										
アブラムシ類	－	○											
アザミウマ類	－	○											
			❖ 生育初期にウイルス病に感染すると被害が大きくなるため、害虫防除を徹底する。 <table><tr><th>発生するウイルス病</th><th>媒介する害虫</th></tr><tr><td>CMV等(トマトモザイク病)</td><td>アブラムシ類</td></tr><tr><td>TYLCV(トマト黄化葉巻病)</td><td rowspan="2">コナジラミ類</td></tr><tr><td>ToCV(トマト黄化病)</td></tr><tr><td>TSWV(トマト黄化えそ病)</td><td rowspan="2">アザミウマ類</td></tr><tr><td>CSNV(トマト茎えそ病)</td></tr></table> ❖ ウイルス病発病株は抜き取り、土中に埋めるなど適切に処分する。 ❖ 施設内外の雑草は、害虫の発生・増殖源になるため、除草を徹底する。 ❖ 施設開口部に0.4mm目合い以下の防虫ネットを2重被覆する。	発生するウイルス病	媒介する害虫	CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類	TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類	ToCV(トマト黄化病)	TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類	CSNV(トマト茎えそ病)
発生するウイルス病	媒介する害虫												
CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類												
TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類												
ToCV(トマト黄化病)													
TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類												
CSNV(トマト茎えそ病)													

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) 神奈川県農業技術センター

【抑制キュウリ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
べと病	やや多	○	(予・治) ホライズンドライフフロアブル [前日,3回] 2,500倍 ☞ ホライズンは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) エトフィンフロアブル [前日,4回] 1,000倍 (予・治) リドミルゴールドMZ [前日,3回] 1,000倍 ☞ リドミルゴールドは混合剤。総使用回数に注意する。 等 ❖ 草勢低下と夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。
うどんこ病	並	○	(予) インプレッションクリア [発病前～発病初期,-] 1,000～2,000倍 (予) ボタニガードES [発病前～発病初期,-] 1,000倍 (予・治) ベルクートフロアブル [前日,7回] 2,000倍 (予・治) パルミノ [前日,3回] 2,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日,-] 300～600倍 等
褐斑病	やや多	○	(予・治) ゲッター水和剤 [前日,5回] 1,500倍 ☞ ゲッターは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) ベルクートフロアブル [前日,7回] 2,000倍 等 ❖ 多湿状態で施設を密閉すると蔓延しやすく、夜間の結露等による葉の濡れが発生を助長する。
コナジラミ類 タバココナジラミ アザミウマ類 ミナミキイロ アザミウマ	やや多 並	○ ○	アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日,2回] コナジラミ類:2,000～3,000倍、アザミウマ類:2,000倍 コルト顆粒水和剤 [前日,3回] コナジラミ類:4,000倍 グレーシア乳剤 [前日,2回] 2,000倍 マッチ乳剤 [前日,3回] コナジラミ類:2,000倍 パルミノ [前日,3回] コナジラミ類:2,000倍 ボタニガードES [発生初期,-] 1,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,-] コナジラミ類:300倍 等 ❖ ウイルス病の感染を防ぐためにも害虫の防除を徹底する。

発生するウイルス病	媒介する害虫
CMV等(キュウリモザイク病)	アブラムシ類
CCYV(キュウリ退緑黄化病)	コナジラミ類
BPYV(キュウリ黄化病)	
MYSV、WSMoV (キュウリ黄化えそ病)	アザミウマ類

- ❖ ウイルス病発病株は抜き取り、土中に埋めるなど適切に処分する。
- ❖ 施設内外の雑草は、害虫の発生・増殖源になるため、除草を徹底する。
- ❖ 施設開口部に0.4mm目合い以下の防虫ネットを2重被覆する。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

【促成イチゴ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
うどんこ病	やや多	○	(予) インプレッションクリア [発病前～発病初期, -] 1,000～2,000倍 (予) フルピカフロアブル [前日, 3回] 2,000～3,000倍 (予) ボタニガードES [発病前～発病初期, -] 1,000倍 (予・治) バレード20フロアブル [前日, 3回] 2,000～4,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍 (治) エコピタ液剤 [前日, -] 100倍 等
アブラムシ類	やや少	○	モスピラン顆粒水溶剤 [前日, 2回] アブラムシ類: 2,000～4,000倍、アザミウマ類: 2,000倍
アザミウマ類	—	○	アフーム乳剤 [前日, 2回] ハスモンヨトウ: 2,000倍
ハスモンヨトウ	並	○	ファインセーブフロアブル [前日, 3回] アザミウマ類: 1,000～2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日, -] アブラムシ類: 300倍 エコピタ液剤 [前日, -] アブラムシ類: 100倍 ボタニガードES [発生初期, -] アブラムシ類、アザミウマ類: 1,000倍 等
ハダニ類	多	○	アフーム乳剤 [前日, 2回] 2,000倍 マイトコーネフロアブル [前日, 2回] 1,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日, -] 300～600倍 エコピタ液剤 [前日, -] 100倍 ボタニガードES [発生初期, -] 1,000倍 等

〔防除要否〕 ◎: 追加防除が必要 ○: 通常防除 △: 必要に応じて防除 ×: 防除の必要なし
〔使用時期〕 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

- ▶ 訪花昆虫・天敵を利用する際は使用薬剤の影響日数に注意して薬剤の選択を行う。
- ▶ 農薬散布の際は、ミツバチ巣箱を施設から出し、巣箱を再導入する前には、換気を十分に行い、薬液が乾いていることを確認すること。

【ネギ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
さび病	並	○	(予・治) アミスター20フロアブル [3日, 4回] 2,000倍 (予・治) ポリオキシシAL水和剤 [14日, 3回] 黒斑病: 1,000倍
黒斑病	並	○	(予・治) サプロール乳剤 [前日, 5回] さび病: 800～1,000倍 等 ❖ 薬液をはじきやすいため、水溶剤や水和剤には展着剤を加用し、薬液が十分付着するように散布する。
ネギアザミウマ	並	○	アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [3日, 2回] アザミウマ類: 2,000倍
ヨトウムシ類	並	○	ディアナSC [前日, 2回] アザミウマ類、シロイチモジヨトウ: 2,500～5,000倍
ハスモンヨトウ	並	○	モスピラン顆粒水溶剤 [7日, 3回] アザミウマ類: 2,000倍
シロイチモジヨトウ	やや多	○	アクセルフロアブル [前日, 2回] シロイチモジヨトウ: 1,000倍 等 ❖ 薬液をはじきやすいため、水溶剤や水和剤には展着剤を加用し、薬液が十分付着するように散布する。

〔防除要否〕 ◎: 追加防除が必要 ○: 通常防除 △: 必要に応じて防除 ×: 防除の必要なし
〔使用時期〕 「収穫＊日前まで」を「＊日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) 神奈川県農業技術センター

【キャベツ:三浦半島地区以外】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
黒腐病	やや多	○	(予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍 ☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) マイコシールド [7日,2回] 1,000～2,000倍 (予・治) バリダシン液剤5 [7日,5回] 800倍 等 ❖ 強い降雨の後には、予防散布を実施する。
菌核病	—	○	(予) セイビアーフロアブル20 [前日,3回] 1,000倍 (予・治) ファンタジスタ顆粒水和剤 [3日,3回] 2,000～3,000倍 (予・治) カンタスドライフロアブル [7日,2回] 1,500倍 等 ❖ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。
コナガ	やや少	○	ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 マッチ乳剤 [7日,3回]
ヨトウムシ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ (ヨトウガ) シロイチモジヨトウ	並 並 やや多	○ ○	コナガ、ヨトウムシ: 2,000～3,000倍 ハスモンヨトウ: 3,000倍 アクセルフロアブル [前日,3回] コナガ:1,000倍 ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガ:1,000～2,000倍 ゼンターリ顆粒水和剤 [発生初期(但し、前日),—] コナガ、ヨトウムシ:1,000～2,000倍 ハスモンヨトウ、オオタバコガ:1,000倍 等
オオタバコガ	並	○	

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) …………… 神奈川県農業技術センター

▼ 三 浦 半 島 地 区 野 菜 ▼

【キャベツ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ※防除のポイント
黒腐病	並	○	(予・治) カセット水和剤 [7日,3回] 1,000倍 ☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) マイコシールド [7日,2回] 1,000～2,000倍 (予・治) バリダシン液剤5 [7日,5回] 800倍 等 ※ 強い降雨の後には、予防散布を実施する。
菌核病	—	○	(予) セイビアーフロアブル20 [前日,3回] 1,000倍 (予・治) ロブラール水和剤 [7日,4回] 1,000倍 等 ※ 被害株は感染源になるため、速やかに除去する。
コナガ	やや少	○	ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 マッチ乳剤 [7日,3回] コナガ、ヨウムシ: 2,000～3,000倍 ハスモンヨトウ: 3,000倍 アクセルフロアブル [前日,3回] コナガ:1,000倍 ハスモンヨトウ、ヨウムシ、オオタバコガ:1,000～2,000倍 チューンアップ顆粒水和剤 [発生初期(但し、前日),—] コナガ、オオタバコガ:2,000～3,000倍、ヨウムシ:2,000倍 等
ヨウムシ類 ハスモンヨトウ ヨウムシ (ヨウガ) シロイチモジヨトウ	並 並 やや多	○ ○	
オオタバコガ	並	○	

【防除要否】 ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
【使用時期】 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【ダイコン】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ※防除のポイント
黒斑細菌病	やや多	○	(予) Zボルドー [発病前～発病初期,—] 500倍 (予・治) カセット水和剤 [14日,3回] 1,000倍 ☞ カセットは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) カッパーシン水和剤又はカスミンボルドー [14日,3回] 1,000倍 ☞ カッパーシン、カスミンボルドーは混合剤。総使用回数に注意 する。 等 ※ 肥料切れしないよう適切な肥培管理をする。 ※ Zボルドーで薬害が懸念される場合は、クレフノン(100～200倍)を加 用する。
白さび病 (ワッカ症)	並	○	(予) ライメイフロアブル [7日,4回] 2,000～4,000倍 (予・治) アミスター20フロアブル [14日,3回] 2,000倍 等 ※ ワッカ症の効果的な防除のために、白さび病を対象として11月上旬に 薬剤散布を実施する。
アブラムシ類	やや多	○	ベネビアOD [前日,3回] 2,000倍 ウララDF [前日,2回] 2,000倍 等
コナガ	やや少	○	ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 チューンアップ顆粒水和剤 [発生初期(但し、前日),—] コナガ:2,000～3,000倍 等
ハモグリバエ類 ナモグリバエ	やや少	○	

【防除要否】 ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
【使用時期】 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) ・・・ 神奈川県農業技術センター

Ⅱ 11月の気象予報と病害虫発生予報の根拠

(1) 11月の気象予報(気象庁 10月20日発表3か月予報)

〈天 気〉

平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〈要素別予報〉

	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気 温	10%	30%	60%
降 水 量	20%	30%	50%
日照時間*	50%	30%	20%

*10月22日発表1か月予報による。

(2) 11月の病害虫発生予報の根拠

作物名	病害虫名	発生量		予 報 の 根 拠
		程度	平年比	
カンキツ	貯蔵病害 青かび病 軸腐病	－	並	1) 県予察ほ(根府川)では、果実の青かび病、緑かび病等の樹上発病は、平年並。(±) 2) 本年の着果量、果皮の厚さ、減酸程度はいずれも平年並。(±) 3) 軸腐病と同じ病原菌で起こる黒点病の発生は、巡回調査では平年よりやや多く(+)、県予察ほ(根府川)では平年並(±)。 4) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	ミカンハダニ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－) 2) 県予察ほ(根府川)では、無防除区で発生が平年よりやや少なく、慣行防除区で発生が平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(±)
抑制トマト 促成トマト	タバココナジラミ	少	やや多	1) 抑制トマトの巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 抑制キュウリの巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
抑制キュウリ	べと病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	うどんこ病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	褐斑病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(＋) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	タバココナジラミ	中	やや多	1) 抑制キュウリの巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 抑制トマトの巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	ミナミキイロアザミウマ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 青色粘着板(平塚、大磯)への誘殺虫数は、平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)

※「発生量」…………… 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (＋): 多発要因 (－): 少発要因

病害虫情報 (令和8年度・第8号・11月) ・・・ 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
促成イチゴ	うどんこ病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+) 2) 育苗期(8月)の調査では、発生が平年並。(±) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	アブラムシ類	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほ(上吉沢)の黄色水盤への飛来量は、平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	ハダニ類	少	多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(+) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
ネギ	さび病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	黒斑病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	ネギアザミウマ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
キャベツ (三浦半島地区を除く)	黒腐病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(+) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	コナガ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜、伊勢原、県予察ほ(上吉沢)ともに平年よりやや少ない(－)。 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
露地野菜全般 (三浦半島地区を除く)	ヨトウムシ類	—	並	1) キャベツの巡回調査では、発生が平年並。(±)
	ハスモンヨトウ	—	並	2) ネギの巡回調査では、発生が平年より多い。(+)
	ヨトウムシ(ヨトウガ)	—	やや多	3) ハスモンヨトウのフェロモントラップへの誘殺数は、伊勢原では平年並(±)、横浜、県予察ほ(上吉沢)では平年よりやや少ない(－)。
	シロイチモジヨトウ	—	やや多	4) ヨトウガのフェロモントラップへの誘殺数は県予察ほ(上吉沢)では平年よりやや少ない。(－) 5) シロイチモジヨトウのフェロモントラップへの誘殺数は、横浜、伊勢原、県予察ほ(上吉沢)ともに平年よりやや少ない。(－) 6) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)
	オオタバコガ	—	並	1) フェロモントラップへの誘殺数は、横浜、伊勢原、県予察ほ(上吉沢)ともに平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(+)

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (+):多発要因 (－):少発要因

病虫害情報 (令和8年度・第8号・11月) ・・・ 神奈川県農業技術センター

三浦半島地区野菜

作物名	病虫害名	発生量		予報の根拠
		程度	年比	
キャベツ	黒腐病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	コナガ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年よりやや少なく、県予察ほ(三浦)では平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
ダイコン	黒斑細菌病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	白さび病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	ナモグリバエ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほ(三浦)の黄色粘着板への誘殺数は平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	アブラムシ類	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年より多い。(＋) 2) 県予察ほ(三浦)の黄色水盤への飛来量は、平年並。(±) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	コナガ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年よりやや少なく、県予察ほ(三浦)では平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
露地野菜全般	ヨトウムシ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ(ヨトウガ) シロイチモジヨトウ	－ － －	並 並 やや多	1) キャベツの巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) ハスモンヨトウのフェロモントラップへの誘殺数は、三浦、県予察ほ(三浦)ともに平年並。(±) 3) ヨトウガのフェロモントラップへの誘殺数は、県予察ほ(三浦)では平年並。(±) 4) シロイチモジヨトウのフェロモントラップへの誘殺数は、三浦、県予察ほ(三浦)ともに平年並。(±) 5) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)
	オオタバコガ	－	並	1) キャベツの巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦、県予察ほ(三浦)ともに平年より少ない。(－) 3) 気温は平年より高く、降水量は平年より多い予報。(＋)

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (＋):多発要因 (－):少発要因